

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28.12.2019 № 2711

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Медикаменти для дітей,
хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флак.	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	флак.	10 мл, 16-20 % (160-200 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	-“-	20 мл, 16-20 % (160-200 мг/мл)	
Ітраконазол	капс.	100 мг	
Ітраконазол	флак.	150 мл № 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл	
Вориконазол	табл.	50 мг	
Вориконазол	-“-	200 мг	

Вориконазол	флак., порошок для розчину для інфузій	200 мг
Амфотерицин В	флак., ліофілізат для розчину для інфузій	50 мг
Посаконазол	суспензія оральна	40 мг/мл, по 105 мл у флаконі
Колістиметат натрію	порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій	1 млн. МО
Тейкопланін	флак., ліофілізат для розчину для ін'єкцій	200 мг
Тейкопланін	-“-	400 мг
Філграстим	розчин для ін'єкцій	300 мкг/мл (30 млн МО) по 1 мл у флаконах
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл
Канакінумаб	амп., флак., шприц	150 мг
Сиролімус	табл.	1 мг
Інгібітор С1-естерази людини	флак., ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО

**Перший заступник Міністра
охорони здоров'я**

Андрій СЕМІВОЛОС