

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28.12.2019 № 2711

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Медикаменти для
дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флак.	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	-“-	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	-“-	10 мл, 15-20 % (150-200 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	-“-	20 мл, 15-20 % (150-200 мг/мл)	
Інгібітор С1-естерази людини	флак., ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	

Анакінра

попередньо
наповнені шприци

100 мг/0,67
мл

**Перший заступник Міністра
охорони здоров'я**

Андрій СЕМІВОЛОС