

Показники життєдіяльності у дітей, значення яких слід враховувати при визначенні сортувальної категорії.

Таблиця 1.

Показники частоти дихання

Вік	≤ - 2 СВ	- 1 СВ	Норм.	+ 1 СВ	+ 2 СВ	> + 2 СВ
0 - 3 місяці	< 20	21 - 30	30 - 60	60 - 70	70 - 80	> 80
4 - 6 місяців	< 20	20 - 30	30 - 60	60 - 70	70 - 80	> 80
7 - 12 місяців	< 17	17 - 25	25 - 45	45 - 55	55 - 60	> 60
1- 3 роки	< 15	15 - 20	20 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
4- 6 років	< 12	12 - 16	16 - 24	24 - 28	28 - 32	> 32
> 7 років	< 10	10 - 14	14 - 20	20 - 24	24 - 26	> 26

Таблиця 2.

Показники частоти серцевих скорочень

Вік	≤ - 2 СВ	- 1 СВ	Норм.	+ 1 СВ	+ 2 СВ	> + 2 СВ
0 - 3 місяці	< 65	65 - 90	90 - 180	180 - 205	205 - 230	> 230
4 - 6 місяців	< 63	63 - 80	80 - 160	160 - 180	180 - 210	> 210
7 - 12 місяців	< 60	60 - 80	80 - 140	140 - 160	160 - 180	> 180
1- 3 роки	< 58	58 - 75	75 - 130	130 - 145	145 - 165	> 165
4- 6 років	< 55	55 - 70	70 - 110	110 - 125	125 - 140	> 140
> 7 років	< 45	45 - 60	60 - 90	90 - 105	105 - 120	> 120

Примітки:

СВ – стандартне відхилення

Червоний колір - категорія сортування 1

Помаранчевий колір – категорія сортування 2

Жовтий колір – категорія сортування 3

Білий колір – категорія сортування не визначається за ЧСС або ЧД

- 2: 1. Пацієнти дитячого віку, яких не слід сортувати за категорією менше ніж категорія
- пацієнти з метаболічним порушенням в анамнезі;
пацієнти із серпоподібноклітинною анемією;
пацієнти з трахеостомією та утрудненим диханням.
- 3: 2. Пацієнти дитячого віку, яких не слід сортувати за категорією менше ніж категорія
- 1) Супутнє захворювання зі значними клінічними проявами:
пацієнти з проблемами дихальних шляхів;
значні респіраторні порушення в анамнезі;
кардіологічні пацієнти;
пацієнти зі значними нирковими порушеннями в анамнезі;
порушення системи гемостазу;
онкологічні пацієнти, які в даний момент проходять онкологічне лікування.
- 2) Немовлята
- 3) Пацієнти з імунodefіцитом
-