

Критерії, які слід враховувати при проведенні медичного сортування у ВЕМД пацієнтів різних вікових груп

1. Критерії травми з високим ризиком значних пошкоджень

Загальна травма	ДТП
Падіння з висоти, що перевищує власний ріст у понад два рази	Велика швидкість транспортних засобів
Проникаюча травма за виключенням локалізації дистальніше коліна чи ліктя, кровотеча контролюється	Пішохід або велосипедист збитий автомобілем
Краш пошкодження	Загиблі у транспортному засобі
Політравма	Невикористання пасків безпеки
Постраждалий з розладами згортання крові або які приймають антикоагулянти	Випадіння з автомобіля або перекидання через автомобіль (включаючи мотоцикл)
Вагітність	
Значні опіки	
Площа опіків більше ніж 15 % поверхні тіла (виключення опіки першого ступеня)	Інгаляційні опіки
Циркулярні опіки або опіки обличчя та шиї	Будь-які опіки у віці менше 2 або більше 70 років
Загроза втрата кінцівки	
Відсутність пульсу або Біль та одне з: блідість, слабкість, оніміння або значний набряк після травми	

2. Інші високонебезпечні критерії

Ознаки дихальної недостатності	
Дорослі	Діти
Дуже швидке або дуже повільне дихання	Дуже швидке дихання. Апноє.
Неможливість говорити або ходити без допомоги	Неможливість говорити, їсти/грудне вигодовування
Сплутана свідомість, сонливість або схвильованість	Роздування крил носу, хрипіння, кивання головою під час дихання, стридор.
Участь в акті дихання додаткової мускулатури	Участь в акті дихання додаткової мускулатури
Вживання/дія небезпечних речовин	
Пацієнти з ризиком вживання або впливу небезпечних речовин повинен бути віднесений до червоної групи для раннього клінічного обстеження	

3. Ступені дегідратації у дітей

Ступінь	Ознаки
Легка	1. Втрата 5 % маси тіла 2. Сухість слизових оболонок. 3. Незначне зменшення сечовиділення. 4. Підвищення відчуття спраги. 5. Дратівливість.
Середня	1. Втрата > 5 % маси тіла 2. Тахікардія. 3. Запалі очі. 4. «Плач без сліз». 5. Зниження тургору шкіри. 6. Запалі джерельця. 7. Олігоурія. 8. Неспокійна поведінка.
Критична	1. Втрата > 10 % маси тіла 2. Порушення перфузії з подовженим часом капілярного наповнення. 3. Холодні кінцівки. 4. Низький артеріальний тиск. 5. Анурія. 6. Порушення свідомості до коматозного стану.