




Алгоритми медичного сортування пацієнтів дитячого віку у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Україні


1. Біль в грудній клітці/ізолювана травма грудної клітки




2. Біль у животі /ізолювана абдомінальна травма




3. Біль у спині / ізолювана травма шиї та/або спини


4. Біль в зовнішніх статевих органах

5. Блювота та діарея




6. Висип (зі зблідненням/без збліднення при натисканні)


7. Прохідність дихальних шляхів / порушення дихання




8. Змінені показники глюкози крові (включаючи хворих на цукровий діабет)



9. Хвора дитина (вік старше 1 року) включаючи пірексію



10. Хвора дитина (молодше 1 року) включаючи пірексію

11. Поєднана травма

1. Порушення прохідності дихальних шляхів або загроза прохідності дихальних шляхів
2. Дихальна недостатність / зупинка дихання
3. Масивна крововтрата, що не контролюється
4. Не реагує / шкала ком Глазго (ШКГ) ≤ 12 балів
5. Судоми на момент огляду
6. Патологічні значення показників життєдіяльності (відповідно до віку - див. додаток 2)
7. Проникаюча травма голови / грудної клітки / живота / таза з ознаками шоку
8. Загроза втрати кінцівки

так

1

ні

1. Патологічні значення показників життєдіяльності (відповідно до віку - див. додаток 2)
2. Шкала ком Глазго (ШКГ) 13 - 14 балів
3. Температура $< 35.5^{\circ}\text{C}$
4. Сильний біль (7-10 з 10)
5. Загрозлива травма / механізм травми в анамнезі (див. додаток 1)
6. Ознаки компенсованого шоку
7. Порушення системи гемостазу в анамнезі
8. Сильна деформація
9. Нервово-судинні порушення
10. У пацієнта фіксований шийний відділ хребта
12. Втрата свідомості в анамнезі > 30 секунд
13. Блювота, що персистує
14. Кров чи серозна рідина в носі або вусі (вухах)
15. Гематоми навколо очей або за вухами
16. Проникаюча травма
17. Явна гематурія / кров у промежині

так

2

ні


1. Патологічні значення показників життєдіяльності (відповідно до віку - див. додаток 2)
2. Помірний біль (4-6 з 10)
3. Втрата свідомості в анамнезі < 30 секунд
4. Амнезія
5. Деформація кінцівки
6. Відкрита рана
7. Незначна кровотеча

так


3

Цих пацієнтів ніколи не слід сортувати за категорією нижче, ніж Категорія 3


12. Опіки




13. Судоми/втрата свідомості/непритомність




* Нові неврологічні симптоми = раптовий початок сплутаності свідомості, слабкості / дратівливості або сонливості. Симптоми також можуть включати зміну рівня свідомості, втрату чутливості, слабкість кінцівок або зміни у функції сечового міхура чи кишки

14. Травма ока/раптове порушення зору


15. Травма голови/головний біль


*Нові неврологічні симптоми = раптовий початок сплутаності свідомості, слабкості / дратівливості або сонливості. Симптоми також можуть включати зміну рівня свідомості, втрату чутливості, слабкість кінцівок або зміни у функції сечового міхура чи кишки

16. Стороннє тіло - неінспіраторного генезу (у разі стороннього тіла інспіраторного генезу скористайтесь алгоритмом «Прохідність дихальних шляхів / порушення дихання»)





17. Стоматологічні проблеми




18. Психосоціальна проблема (включаючи самопошкодження)


Цих пацієнтів ніколи не слід сортувати за категорією нижче, ніж Категорія 4

19. Патологія сечостатевої системи


20. Патологія з боку верхніх дихальних шляхів (ротоглотка)

21. Патологія вуха/носа

22. Патологія/травма кінцівки



23. Передозування та отруєння



Якщо у пацієнта є психосоціальна проблема, зверніться до алгоритму «Психосоціальна проблема (включаючи самопошкодження)»

24. Поранення/ознаки місцевого запалення

